



治傷風顆粒說明書

請仔細閱讀說明書并按說明使用或在藥師指導下購買和使用

警告語：本品含有對乙酰氨基酚、咖啡因、鹽酸那可丁、馬來酸氯苯那敏。本品含有麻黃，運動員慎用。

【藥品名稱】

通用名稱：治傷風顆粒

漢語拼音：Zhishangfeng Keli

【成份】葛根、麻黃、桂枝、白芍、大棗、生薑、甘草、人參、對乙酰氨基酚、咖啡因、鹽酸那可丁、馬來酸氯苯那敏。輔料為：乳糖、蔗糖、羧甲纖維素鈉、糖精鈉。

【性狀】本品為灰棕色的顆粒，氣香，味苦。

【功能主治】緩解感冒引起的鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、咳嗽、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛等症狀。

【規 格】每袋裝2克(相當於飲片1.236克，含對乙酰氨基酚240毫克，咖啡因50毫克，鹽酸那可丁10毫克，馬來酸氯苯那敏2毫克)

【用法用量】飯後服用，一次1袋，一日3次。

【不良反應】可見惡心、頭痛或失眠或心率加快；嗜睡、口渴、多尿、咽喉痛、困倦、虛弱感、心悸、皮膚瘀斑、出血傾向；偶見皮疹、蕁麻疹、藥熱及白血球減少；長期大量用藥會導致肝腎功能異常。

【禁忌】

1. 對馬來酸氯苯那敏、對乙酰氨基酚、咖啡因、鹽酸那可丁過敏者禁用。
2. 苯酮尿症患者不得服用本品。
3. 嚴重肝腎功能不全者禁用。

【注意事項】

1. 忌煙、酒及辛辣、生冷、油膩食物。
2. 不宜在服藥期間同時服用滋補性中藥。
3. 本品含有對乙酰氨基酚、咖啡因、鹽酸那可丁、馬來酸氯苯那敏。服用本品期間不得飲酒或含有酒精的飲料；不能同時服用與本品成份相似的其他抗感冒藥；避免服用咖啡因藥片或飲料；對阿司匹林過敏者慎用；肝、腎功能不全者慎用；膀胱頸梗阻、甲狀腺功能亢進、青光、眼、高血壓、呼吸疾病(如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難)和前列腺肥大者慎用；孕婦及哺乳期婦女慎用；新生兒、早產兒不宜使用；服用期間不得駕駛機、車、船、從事高空作業、機械作業及操作精密儀器。
4. 心臟病、糖尿病等慢性病患者應在醫師指導下服用。
5. 嚴格按用法用量服用，兒童、老年體弱者應在醫師指導下服用。
6. 請勿超劑量使用，若有副作用產生，應立即停藥到醫院就診。
7. 需要與其他藥品聯合使用時，在醫師的指導下使用。
8. 服藥3天症狀無緩解，應去醫院就診。
9. 對本品過敏者禁用，過敏體質者慎用。
10. 本品性狀發生改變時禁止使用。
11. 兒童必須在成人監護下使用。
12. 請將本品放在兒童不能接觸的地方。
13. 如正在使用其他藥品，使用本品前請諮詢醫師或藥師。
14. 運動員慎用。運動員應在醫師指導下使用。

【藥物相互作用】 1. 與其他解熱鎮痛藥并用，有增加腎毒性的危險。
2. 如與其他藥物同時使用可能會發生藥物相互作用，詳情請諮詢醫師或藥師。

【貯 藏】 密封。

【包 裝】 聚酯/鋁/聚乙烯/流延聚丙烯藥用複合膜包裝。3袋/盒，6袋/盒，120袋/盒，240袋/盒。

【有效期】 36個月。

【執行標準】 進口藥品註冊標準JZ20220001

【批准文號】 國藥准字ZC20171003

【說明書修訂日期】 2024年3月20日

【藥品上市許可持有人】

名 稱：明通化學製藥股份有限公司第二廠

註冊地址：台灣省台中市工業區21路15號

【生產企業】

企業名稱：明通化學製藥股份有限公司第二廠

生產地址：台灣省台中市工業區21路15號

郵政編碼：40850

電話號碼：00886-4-23590107

傳真號碼：00886-4-23591074

網 址：www.mintong.com.tw

【中國大陸聯絡處】

公司名稱：深圳市羅素醫藥有限公司

註冊地址：深圳市福田區梅林街道中康路

卓越梅林中心廣場一期2號樓1A01室

郵政編碼：518049

電話號碼：0755-82405467

傳真號碼：0755-25925442

【分包裝企業】

企業名稱：成都恒瑞製藥有限公司

生產地址：成都高新區西部園區百草路18號

如有問題可與上市許可持有人或境內代理人聯繫

